



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی

دستورالعمل استفاده از شربت کلرال هیدرات و میدازولام در انجام نوار مغزی اطفال

۱. دادن شربت کلرال هیدرات در نوزادان زیر ۳ ماه ممنوع می باشد .

۲. ترجیحا در اطفال ۳-۶ ماه نیز دارو داده نشود .

۳. جهت اطفال بالای ۶ ماه میزان دوز شربت کلرال هیدرات بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد .

۴. میزان محاسبه دوز دارو ، بالای ۶ ماه به ازای نصف وزن آنها شربت داده می شود .

مثال :

* وزن ۸ کیلو گرم ۴ سی سی

* وزن ۱۰ کیلوگرم ۵ سی سی

۵. در اطفال بیش فعال و اوتیسم با تجویز پزشک باید با دوز مشخص شده از طرف پزشک قرص کلونیدین داده شود . (با نسخه

پزشک)

۶. زمان مصرف شربت باید ۳۰ الی ۴۵ دقیقه قبل از انجام پروسیجر نوار مغز باشد .

۷. مادر و کودک در محیط آرام و در دید پرسنل باید باشد که در صورت وجود علایم (تنگی نفس و یا آپنه و ...) سریعا اقدامات

لازم انجام شود .

۸. بیماران بستری از بخش اطفال که دستور نوار مغز دارند انجام پروسیجر با هماهنگی و حضور پرستار در درمانگاه اقدام می گردد

۹. در صورت عدم توانایی در دادن داروهای خوراکی برای انجام نوار می توان از دوز میدازولام به صورت یک بار به مقدار

۰/۰۵ تا ۰/۱ میلی گرم بر اساس وزن استفاده کرد .