



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

زنبان

مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی

تب کریمه کنگو

CCHF



تهیه و تنظیم: واحد کنترل عفونت

اردیبهشت ۱۴۰۴

- خودداری از رفت و آمد در محلهای کشتار غیر مجاز
- خودداری از توزیع گوشت فاقد مهر دامپزشکی به قصابی ها
- اجتناب از خوردن جگر خام و نیم پخته
- نگهداری جگر ، قلب ، کلیه به مدت حداقل ۲۴ ساعت در یخچال و سپس استفاده از آن
- آموزش افراد در معرض خطرواطلاع رسانی عمومی
- روشهای حفاظت شخصی در تماس با ترشحات و خون حیوان (پوشیدن دستکش ، لباس بلند ، چکمه ، ماسک و عینک) به خصوص برای سلاخان



❖ درمان بیماری :

- ✓ ۱. درمان حمایتی: شامل اصلاح آب و الکترولیتها
- ✓ ۲. Ribavirine بلافاصله پس از تشخیص موارد محتمل باید تجویز شود (طول مدت درمان ۱۰ روز است)
- ✓ در مواردی که با پیش آگهی بدی همراه است دارو وریدی تجویز می شود.
- ✓ عوارض ریباویرین: همولیز خارج عروقی، سرکوب مغز استخوان، افزایش بیلی روبین، خارش، راش، تهوع، دپرسیون و سندرمهای تنفسی

❖ پیشگیری از بیماری:

- روشهای حفاظت شخصی از گزش کنه و حشرات

❖ تعریف:

ویروس تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو (CCHF) باعث شیوع شدید تب خونریزی دهنده ویروسی می شود. میزان شیوع CCHF تا ۴۰٪ موارد مرگ و میر دارد. این ویروس در درجه اول از طریق کنه و حیوانات دامی به افراد منتقل می شود. انتقال انسان از انسان می تواند در اثر تماس نزدیک با خون، ترشحات، اندام ها یا سایر مایعات بدن افراد آلوده رخ دهد.

❖ علائم بیماری:

شروع علائم ناگهانی، همراه با تب، میالژی، سرگیجه، درد و سفتی گردن، کمردرد، سردرد، چشم درد و فوتوفوبیا است. ممکن است در اوایل حالت تهوع، استفراغ، اسهال، شکم درد و گلو درد وجود داشته باشد، به دنبال آن نوسانات خلقی شدید و گیجی ایجاد شود.

تاکی کاردی، لنفادنوپاتی و بثورات پتشیال (بثورات ناشی از خونریزی در پوست) در سطوح مخاط داخلی، مانند دهان و گلو و روی پوست. پتشی و اکیموز و بیماران شدیداً بیمار پس از روز پنجم بیماری ممکن است دچار تخریب سریع کلیه، نارسایی ناگهانی کبد یا نارسایی ریوی شوند.

❖ راه انتقال بیماری CCHF:

۱. گزش کنه: کنه های سخت جنس Hyalomma ویروس از تخم کنه به نسل های بعدی انتقال میابد
۲. لاشه حیوان - خون و ترشحات حیوان آلوده (مصرف گوشت و جگر خام)
۳. تماس با خون و بافتهای بیمار مبتلا



❖ تشخیص بیماری:

- در مرحله حاد، جدا کردن ویروس
- پس از یک هفته بررسی بررسی IgM و IgG به روش ELISA
- بررسی آنتی ژن با روش ایمنوفلورسانس ELISA و PCR و RT-PC



❖ دوره کمون:

- در صورت گزش کنه حداکثر ۹ روز
- در صورت تماس با بافتها و خون آلوده حداکثر ۱۳ روز
- مرحله قبل از خونریزی: حداکثر ۳ روز
- مرحله خونریزی دهنده: حدود ۴ روز
- دوره نقاهت: ۳-۱۶ روز

❖ گروه های در معرض خطر:

- دامداران، چوپانها، کشاورزان، دانش آموزان
- دامپزشکان و کارکنان دامپزشکی، عشایر
- سلاخان، قصابان و کارکنان کشتارگاه
- پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان
- کارکنان رستورانها و کبابی ها

